

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

**АРТРАВИР®-ТРИВИУМ®**

торговое наименование лекарственного препарата

**Регистрационный номер:** ЛП-004234

**Торговое название препарата:** АРТРАВИР®-ТРИВИУМ®

**Группировочное наименование:** хондроитина сульфат

**Лекарственная форма:** капсулы

**Состав:**

**Состав на одну капсулу:**

***Действующее вещество:***

|                            |          |          |
|----------------------------|----------|----------|
| Хондроитина сульфат натрия | 250,0 мг | 500,0 мг |
|----------------------------|----------|----------|

***Вспомогательные вещества:***

|                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| Кроскармеллоза натрия | 20,0 мг | 20,0 мг |
|-----------------------|---------|---------|

|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
| Повидон-К25 | 5,0 мг | 5,0 мг |
|-------------|--------|--------|

|  |          |         |
|--|----------|---------|
| Целлюлоза микрокристаллическая (МКЦ-102) | 140,0 мг | 60,0 мг |
|--|----------|---------|

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| Магния стеарат | 5,0 мг | 5,0 мг |
|----------------|--------|--------|

***Капсулы твердые желатиновые № 0***

*Состав корпуса капсулы:* титана диоксид - 2,0 %, желатин - до 100 %.

*Состав крышечки капсулы:* краситель азорубин - 0,0016 %, краситель хиноли-новый желтый - 1,1496 %, краситель синий патентованный - 0,1642 %, краситель бриллиантовый черный - 0,0958 %, титана диоксид - 1,3333 %, желатин - до 100 %.

***Капсулы твердые желатиновые № 00***

*Состав корпуса капсулы:* краситель азорубин - 0,5680 %, краситель бриллиан-товый черный - 0,0019 %, титана диоксид - 1,3333 %, краситель солнечный закат желтый - 0,1861 %, желатин - до 100 %.

*Состав крышечки капсулы:* краситель азорубин - 0,5680 %, краситель бриллиан-товый черный - 0,0019 %, титана диоксид - 1,3333 %, краситель солнечный закат желтый - 0,1861 %, желатин - до 100 %

**Описание:**

*Капсулы 250 мг: капсула № 0.* Корпус капсулы белого цвета, крышечка темно-зеленого цвета, непрозрачные.

*Капсулы 500 мг: капсула № 00.* Корпус капсулы ярко-красного цвета, крышечка ярко-красного цвета, непрозрачные.

Содержимое капсул – смесь порошка и гранул с кристаллическими включениями, белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Гранулы неправильной формы, разного размера, допускается уплотнение содержимого капсулы по форме капсулы, распадающееся при нажатии стеклянной палочкой.

**Фармакотерапевтическая группа:** регенерации тканей стимулятор

**Код АТХ:** M01AX25

### **Фармакологические свойства**

#### **Фармакодинамика**

Влияет на обменные процессы в гиалиновом и волокнистом хрящах, уменьшает дегенеративные изменения в хрящевой ткани суставов, стимулирует биосинтез гликозаминогликанов.

Замедляет резорбцию костной ткани и снижает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани.

При лечении препаратом АРТРАВИР®-ТРИВИУМ® уменьшается болезненность и улучшается подвижность пораженных суставов. Терапевтический эффект сохраняется длительное время после окончания курса лечения.

#### **Фармакокинетика**

Более 70 % хондроитина сульфата всасывается в пищеварительном тракте. Биодоступность препарата составляет 13 %. При однократном приеме внутрь среднетерапевтической дозы максимальная концентрация в плазме отмечается через 3-4 часа, в синовиальной жидкости через 4-5 часов. Абсорбированный в желудочно-кишечном тракте препарат накапливается в синовиальной жидкости. Выводится почками.

#### **Показания к применению**

Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника: первичный артроз, межпозвоноковый остеохондроз.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст до 15 лет (ввиду отсутствия точных данных).

**С осторожностью:** пациентам с кровотечениями, а также пациентам со склонностью к кровотечениям, тромбозам, тромбофлебиту.

## **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата АРТРАВИР®-ТРИВИУМ® при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

## **Способ применения и дозы**

Внутрь, запивая водой. Взрослым и подросткам с 15 лет назначают по 1 г в сутки - по 2 капсулы 250 мг или по 1 капсуле 500 мг 2 раза в день. Рекомендуемая продолжительность начального курса лечения составляет 6 месяцев, период действия препарата после его отмены - 3-5 месяцев в зависимости от локализации и стадии заболевания, продолжительность повторных курсов лечения устанавливается врачом.

## **Побочное действие**

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота.

*Аллергические реакции:* аллергические реакции (крапивница, эритема, кожный зуд).

## **Передозировка**

В редких случаях возможны проявления симптомов передозировки со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея; при длительном приеме чрезмерно высоких доз (свыше 3 г в сутки) возможны геморрагические высыпания. Лечение симптоматическое.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

При одновременном применении препарата АРТРАВИР®-ТРИВИУМ® с другими лекарственными средствами возможно усиление действия непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов, фибринолитиков.

## **Особые указания**

***Влияние на способность управлять автотранспортом и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности***

Не влияет на способность управлять автотранспортом и на занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

## **Форма выпуска**

Капсулы 250 мг и 500 мг.

По 5, 6, 10 капсул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

Или по 10, 20, 30, 50, 60 или 120 капсул в банку полимерную для лекарственных средств, укупоренную крышкой из полиэтилена высокого давления с контролем первого вскрытия

или крышкой из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия, или крышкой полипропиленовой с системой «нажать-повернуть».

Одну банку или 1, 2, 3, 4, 5, 6, или 12 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку (пачку).

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей**

ООО «Тривиум-XXI».

Юридический адрес: Россия, 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 6, этаж 2, пом. VI, комн. 1.

Телефон: (495) 788-59-06.

[www.trivium21.ru](http://www.trivium21.ru)

[www.artravir.com](http://www.artravir.com)

#### **Производитель**

ООО «Озон».

Россия, 445351, Самарская обл., г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

Телефон/факс: (84862) 3-41-09.

E-mail: [ozon@ozon-pharm.ru](mailto:ozon@ozon-pharm.ru)

[www.ozonpharm.ru](http://www.ozonpharm.ru)

Директор

ООО «Тривиум-XXI»

Чубаев А.А.