

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АРТРАВИР®-ТРИВИУМ®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: АРТРАВИР®- ТРИВИУМ®

Международное непатентованное наименование: хондроитина сульфат

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав на 100 г мази:

Действующее вещество: хондроитина сульфат натрия - 5,0 г.

Вспомогательные вещества:

диметилсульфоксид - 10,0 г, ланолин безводный - 15,0 г, вазелин - 50,0 г, вода очищенная - до 100,0 г.

Описание: мазь светло-желтого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: репарации тканей стимулятор

Код АТХ: M01AX25

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

АРТРАВИР®-ТРИВИУМ® содержит натуральный компонент хондроитина сульфат (высокомолекулярный мукополисахарид), получаемый из тканей крупного рогатого скота. Хондроитина сульфат стимулирует регенерационные (восстановительные) процессы и нормализует обмен веществ в суставном хряще, оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза. Хондроитина сульфат улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ускоряет процессы ее репарации, тормозит процессы дегенерации (разрушения) хрящевой ткани; препятствует коллапсу соединительной ткани; ингибирует ферменты, вызывающие повреждение хрящевой ткани, стимулирует синтез глюкозаминогликанов, способствует регенерации (восстановлению) суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, увеличивает продукцию внутрисуставной

жидкости. Это приводит к уменьшению болезненности и увеличению подвижности пораженных суставов.

Фармакокинетика

Лекарственный препарат хорошо всасывается. В соответствии с данными, полученными в экспериментальных исследованиях на мышах с использованием радиомеченого 3Н-хондроитина сульфата, показатель всасываемости хондроитина сульфата составляет 14%. Диметилсульфоксид, входящий в состав мази, способствует лучшему проникновению хондроитина сульфата через клеточные мембраны вглубь тканей. Хондроитина сульфат после нанесения мази на кожу поступает в сустав с достижением максимальной концентрации через 30 минут и последующим двухфазным выведением препарата из хрящевой ткани. Завершение быстрой фазы выведения происходит через 1 час после применения. Время удержания препарата в суставе составляет 5 часов.

Показания к применению

Лечение и профилактика остеохондроза позвоночника, остеоартроза.

Противопоказания

Гиперчувствительность к хондроитина сульфату или любому из вспомогательных веществ препарата. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения препарата.

С осторожностью

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания возможно, когда ожидаемая польза от применения препарата для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно: наносят 2-3 раза в день на кожу над очагом поражения и втирают в течение 2-3 минут до полного впитывания. Курс лечения - 2-3 недели. При необходимости - курс лечения повторяют после консультации врача.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Передозировка

О случаях передозировки хондроитина сульфата не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата АРТРАВИР®- ТРИВИУМ® на слизистые оболочки и открытые раны. Не применять препарат без консультации врача при беременности, в период грудного вскармливания, в детском возрасте.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность пациента заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 5 %.

По 10 г, 15 г, 20 г, 25 г, 30 г, 50 г, 75 г или 100 г в тубу алюминиевую для упаковывания лекарственных средств.

По 20 г, 25 г, 30 г или 50 г помещают в банку темного стекла укупоренную крышкой натягиваемой из полиэтилена низкой плотности с уплотняющим элементом.

Каждую тубу или банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии от потребителей

ООО «Тривиум-XXI»

Юридический адрес: Россия, 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, дом 6, этаж 2, помещение VI, комната 1.

Тел.: (495) 788-59-06.

www.trivium21.ru

www.artravir.com

Производитель

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»

Юридический адрес/Адрес места производства:

Россия, 170024, г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 2.

Телефон: (4822) 44-47-26

Директор

ООО «Тривиум-XXI»

А.А. Чубаев